



FundMed
Pesquisa Ensino Inovação



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA)
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE (ISCOMPA)

PROCESSO SELETIVO SUPLEMENTAR PARA RESIDÊNCIA MÉDICA UFCSPA/ISCOMPA 2025

RESIDÊNCIA MÉDICA: ACESSO DIRETO

NEUROCIRURGIA

Nome: _____

Nº de Inscrição:

--	--	--	--	--	--

Instruções

- Confira o material recebido (CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal da sala.
- Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA), assine no local indicado.
- Este caderno contém **40 questões de múltipla escolha**, com quatro alternativas (**A, B, C e D**), das quais somente uma será a correta.
- O cartão de respostas é o único documento válido para a correção da prova objetiva, sendo de responsabilidade do candidato sua guarda durante a prova, seu preenchimento e sua entrega ao fiscal de sala.
- Preencha o CARTÃO DE RESPOSTAS, com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique, no CARTÃO DE RESPOSTAS, as instruções para preenchimento. Sob nenhuma circunstância o cartão de respostas será substituído devido a erro, desatenção ou falha no preenchimento por parte do candidato.
- Durante a realização da prova, estão vedados o empréstimo de materiais, a comunicação entre candidatos ou terceiros, a utilização de quaisquer dispositivos, como máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- A prova objetiva terá duração de até **3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Após o início da prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo **tempo mínimo de 60 minutos**.
- Ao terminar a prova, o candidato devolverá ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- O candidato somente poderá levar o caderno de provas **quando estiver faltando 30 minutos para o término do tempo total de duração da prova**. Por razões de segurança, o candidato que sair antes desse horário não poderá copiar as suas respostas.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar o lacre do material, quando então poderão retirar-se do local após concluído o procedimento.

CIRURGIA GERAL

1. Em relação ao trauma vascular, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Secções parciais das artérias e veias cursam com hemorragias menos extensas do que transecções totais.
- (B) O tratamento endovascular é contraindicado para controle de hemorragia associada a fraturas pélvicas.
- (C) A cirurgia de controle de danos pode ser adotada como estratégia em pacientes graves com lesões vasculares associadas, realizando-se desvios (shunts) intraluminais temporários.
- (D) A fasciotomia descompressiva é mais frequentemente necessária na coxa devido a maior massa muscular.

2. As anomalias vasculares são divididas em dois grandes grupos: tumores e malformações. Os tumores vasculares são caracterizados por aumento da proliferação anormal do endotélio. O tumor vascular mais comum é:

- (A) Hemangioma.
- (B) Angiosarcoma.
- (C) Hemangioendotelioma.
- (D) Hemangiopericitoma.

3. Entre as alternativas abaixo, assinale o melhor exame para avaliação do estadiamento linfonodal da neoplasia de esôfago.

- (A) Tomografia computadorizada.
- (B) Ressonância magnética.
- (C) Ecoendoscopia.
- (D) PET CT.

4. Sobre o manejo da pancreatite aguda, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O uso de narcóticos, principalmente morfina, deve ser evitado.
- (B) A antibioticoterapia profilática está indicada nos casos de pancreatite aguda grave.
- (C) O exame de tomografia de abdome deve ser solicitado no momento do diagnóstico para avaliação de necrose pancreática.
- (D) Se houver formação de uma coleção fluida peripancreática, não é indicada a punção guiada, já que geralmente resolve-se de forma espontânea.

5. Sobre os linfomas gástricos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O estômago é o sítio mais comum de linfomas no sistema gastrointestinal.
- (B) O linfoma apresenta-se mais comumente em pacientes jovens.
- (C) O linfoma gástrico mais comum é o de célula marginal extranodal (MALT).
- (D) O linfoma MALT não apresenta relação com gastrite associado ao *H. pylori*.

6. Sobre as lesões de Dieulafoy, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O defeito mucoso geralmente é grande e fácil de ser identificado.
- (B) São lesões onde a tatuagem endoscópica não tem benefício.
- (C) São malformações vasculares primordiais ao longo da pequena curvatura do estômago.
- (D) Sangramentos não identificados têm gastrectomia segmentar contraindicada.

7. Paciente com histórico de DRGE (doença do refluxo gastroesofágico), anêmico, submetido à endoscopia digestiva alta. Endoscopista descreveu a presença de úlcera de Cameron, que consiste em úlcera:

- (A) De esôfago proximal.
- (B) De esôfago distal.
- (C) Em mucosa gástrica, na porção do estômago envolvida na hérnia hiatal.
- (D) Com vaso visível e sangrante.

8. O midazolam tem sido rotineiramente utilizado em procedimentos cirúrgicos menores e, em cirurgias maiores, é uma alternativa para a indução da anestesia. Sobre essa medicação, é CORRETO afirmar que:

- (A) Potencializa o efeito inibitório do GABA, modulando a atividade de receptores GABA-A por meio de sua ligação com seu sítio específico.
- (B) Eventos adversos cardiorrespiratórios graves com risco de morte são pouco prováveis em crianças.
- (C) Em indivíduos com idade superior a 40 anos, a dose deve ser diminuída e as funções vitais monitoradas.
- (D) Amnésia anterógrada é uma reação adversa pouco comum.

CLÍNICA MÉDICA

9. Qual alternativa traz a mudança mais recente nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes em relação ao diagnóstico de diabetes mellitus?

- (A) Exclusão da hemoglobina glicosilada como critério para diagnóstico.
- (B) Inclusão do valor do teste oral de tolerância à glicose 1h \geq 209mg/dL.
- (C) Modificação do valor de 2h do teste oral de tolerância à glicose para \geq 155mg/dL.
- (D) Modificação no ponto de corte de glicemia de jejum para \geq 120mg/dL.

10. Sobre as complicações da nutrição parenteral total, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

I. A síndrome da realimentação é causada por infusão intravenosa de dextrose excessiva, que induz substancialmente a liberação de insulina, reduzindo as concentrações sanguíneas de potássio, magnésio e fósforo como resultado de *shift* intracelular e consumo nas vias metabólicas dos carboidratos.

II. A administração de altas doses de lipídeos pode precipitar sintomas de deficiências de tiamina, pois esta é cofator para rota metabólica lipídica.

III. A hiperinsulinemia causada pelo excesso de aporte de carboidrato leva à retenção renal de sódio e de água.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

11. A respeito de disfagia e suas possíveis causas, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Candidíase esofágica é uma das causas de disfagia e é comum nos pacientes imunossupressos ou diabéticos, mas também pode ocorrer nos pacientes imunocompetentes que têm estase esofágica intensa (como na acalasia).
- () Divertículos esofágicos são encontrados em menos de 1% dos estudos radiológicos do trato gastrointestinal superior e são responsáveis por menos de 5% dos casos de disfagia.
- () A acalasia é um distúrbio motor esofágico que pode representar uma apresentação paraneoplásica de alguma doença maligna, especialmente câncer de pequenas células do pulmão.
- () A retocolite ulcerativa pode provocar o desenvolvimento de ulcerações esofágicas, embora seja uma causa incomum de disfagia.

- (A) E - E - E - E.
- (B) C - C - C - C.
- (C) C - E - E - E.
- (D) C - C - C - E.

12. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre risco cardiovascular e condição clínica, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Risco baixo a intermediário.
- (2) Risco alto.
- (3) Risco muito alto.

- () Mulher de 50 anos, DM2 há 10 anos, TFG 43mL/min/1,73m² e albuminúria 50mg/g.
- () Homem de 48 anos, DM2 há 7 anos, sem fatores de risco cardiovascular, sem história de evento cardiovascular.
- () Mulher de 57 anos, DM2 há 8 anos, com hipertensão arterial, sem história de evento cardiovascular.
- () Homem de 60 anos, DM2 há 5 anos e TFG 25mL/min/1,73m².

- (A) 2 - 2 - 1 - 2.
- (B) 2 - 1 - 2 - 3.
- (C) 3 - 1 - 2 - 3.
- (D) 3 - 2 - 1 - 2.

13. Paciente portador de DPOC em uso de formoterol+budesonida e tiotrópio vem à emergência com queixa de piora da dispneia e tosse produtiva purulenta. Sem exacerbações nos últimos dois anos. Relata piora da sibilância. Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza esse quadro de exacerbação?

- (A) A poluição ambiental com material particulado, dióxido de enxofre e ozônio é a principal causa de exacerbação da DPOC.
- (B) *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis* e *Pneumococo* são as bactérias prováveis de causarem essa exacerbação.
- (C) *Pseudomonas aeruginosa* é a bactéria provável de causar essa exacerbação.
- (D) O tratamento dessa exacerbação demanda a associação de um betalactâmico e um macrolídeo.

14. Sobre as metástases cerebrais, pode-se afirmar que:

- (A) Ocorrem majoritariamente na junção da substância cinzenta com a substância branca, não respeitando, na maioria dos casos, a anatomia vascular.
- (B) A grande maioria das metástases (cerca de 85%) se localiza na região infratentorial.
- (C) Os sítios primários mais frequentes para as metástases cerebrais são pulmão e mama.
- (D) Melanoma é a lesão com menor propensão a gerar metástases no sistema nervoso central.

15. Considerando a avaliação das cefaleias secundárias, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Cefaleia de início abrupto associada à rigidez de nuca é sugestiva de hemorragia subaracnóidea.
- (B) Cefaleia de padrão ortostático é sugestiva de distúrbio de fluxo do líquido cefalorraquidiano.
- (C) Claudicação mandibular em paciente idoso é sugestiva de disfunção temporomandibular.
- (D) A hipótese de glaucoma deve ser afastada em indivíduo com dor periorbital associada à hiperemia conjuntival e à midríase.

16. Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico (LES), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) De etiologia multifatorial, afeta múltiplos órgãos e sistemas, incluindo o sistema nervoso central, o que eleva a morbidade e a mortalidade.
- (B) As manifestações psiquiátricas são relativamente comuns e parecem estar ligadas à presença de anticorpos específicos, como antiaquaporina 4, anti-P ribossomal, antifosfolípidos, entre outros.
- (C) As manifestações psiquiátricas mais comuns são depressão e psicose.
- (D) A psicose lúpica está relacionada à doença ou ao uso de doses elevadas de corticoides.

**MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL (SAÚDE COLETIVA E
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE)**

17. Se a especificidade de um teste é de 98%, o que isso indica?

- (A) 98% dos doentes serão identificados como positivos.
- (B) 98% dos saudáveis serão identificados como negativos.
- (C) 98% dos resultados positivos serão verdadeiros positivos.
- (D) 98% dos resultados negativos serão verdadeiros negativos.

18. Um homem de 65 anos faz um teste para insuficiência cardíaca com uma razão de verossimilhança positiva (RVP) de 5 e uma razão de verossimilhança negativa (RVN) de 0,2. Se o teste for positivo, quais das seguintes afirmativas estão CORRETAS?

- I. A probabilidade de insuficiência cardíaca aumenta significativamente após o teste.
- II. A RVN baixa sugere que o teste é bom para excluir a insuficiência cardíaca.
- III. A especificidade do teste é maior do que a sensibilidade.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

19. Em relação à metanálise, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Garante uma estimativa precisa independente dos estudos que combina.
- II. Combina resultados de múltiplos estudos para obter uma estimativa geral.
- III. Pode sofrer de viés de publicação se apenas estudos positivos forem incluídos.

- (A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

20. Sobre o conceito de confusão, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. É uma variável que está associada tanto à exposição quanto ao desfecho.
- II. Leva a uma superestimação da associação que se está medindo.
- III. Uma das técnicas para controlar um fator de confusão é a randomização.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

21. Considerando as vantagens de um estudo transversal, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. É útil para estimar a incidência de uma condição.
- II. Geralmente, é menos caro e mais rápido do que estudos longitudinais.
- III. Pode determinar a causalidade entre exposição e desfecho.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.

22. Considerando um estudo de coorte, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Pode ser prospectivo ou retrospectivo.
- II. Pode calcular diretamente o risco relativo.
- III. É útil para estudar doenças raras.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

23. Um estudo investigou a associação do consumo de frutas e vegetais com doenças cardiovasculares (DCV) em uma população adulta. Os participantes foram seguidos por 15 anos e foi observado que aqueles que consumiram pelo menos 5 porções de frutas e vegetais por dia tiveram uma razão de risco (hazard ratio - HR) de 0,75 em comparação com aqueles que consumiram menos de 2 porções por dia. Como interpretar esses resultados com relação ao consumo de frutas e vegetais?

- (A) Aumenta o risco de DCV em 25%.
- (B) Não está associado ao risco de DCV.
- (C) Diminui o risco de DCV em 25%.
- (D) Diminui o risco de DCV em 75%.

24. Sobre a promoção da saúde mental, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.




- I. A intervenção em adultos, adolescentes ou crianças que não estão clinicamente doentes, mas que se encontram em alto risco (p. ex., exposição a estressores como violência ou negligência), é uma abordagem de prevenção que mostrou ter bom custo-benefício.
- II. Mesmo quando um transtorno psiquiátrico é identificado, pessoas com vulnerabilidades socioeconômicas, com frequência, não conseguem acesso a serviços de saúde mental adequados em suas comunidades.
- III. A psicoeducação sobre depressão para pessoas identificadas com sintomas depressivos subliminares não parece ser capaz de ajudar na recuperação caso o tratamento padrão seja instituído, uma vez que o transtorno depressivo tem alta herdabilidade.


- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

25. Associe as figuras abaixo com suas respectivas e corretas alterações.

I.



II.



III.



- () Placenta prévia.
- () Acretismo placentário.
- () Vasa prévia.

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e I.
- (C) III, II e I.
- (D) III, I e II.

26. Sobre a necessidade do uso de fórceps, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Diagnóstico correto da variedade de posição e a atitude da cabeça.
- II. Dilatação de colo uterino completa.
- III. Membranas amnióticas rotas.
- IV. Bexiga materna vazia (por sondagem vesical).

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

27. Sobre a doença trofoblástica gestacional, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Entre os fatores de risco, podemos citar os extremos de idade (abaixo de 20 e acima de 35 anos).
- (B) São manifestações clínicas suspeitas: sangramento uterino de intensidade variável e útero aumentado de volume para idade gestacional.
- (C) A mola hidatiforme completa ocorre quando um óvulo com carga genética (n) presente é fecundado por 2 espermatozoides (2n), resultando em um cariótipo triploide.
- (D) Os tumores trofoblásticos placentários e epitelioides são formas neoplásicas raras desse conjunto de patologias.

28. Em relação aos transtornos psiquiátricos na gestação, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Pacientes com transtorno bipolar têm risco de recorrência maior se a medicação for descontinuada durante a gestação.
- II. Apesar de prevalente, a ansiedade patológica não está associada a parto prematuro e baixo peso ao nascer.
- III. A depressão materna está associada a menor crescimento intrauterino, parto prematuro e prejuízo cognitivo, comportamental e emocional na prole.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

29. Sobre procedimento diante de um resultado de citopatológico ASC-US, avalie se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinale a sequência correspondente.

- () Mulheres < 25 anos devem repetir o citopatológico (CP) somente aos 25 anos, idade de iniciar o rastreamento no Brasil.
- () Mulheres > 30 anos, multíparas e tabagistas, devem repetir após 3 meses e, posteriormente, após 6 meses, pelos fatores de risco.
- () Mulheres entre 25 e 29 anos devem repetir o citopatológico (CP) em 1 ano.
- () Se a mulher estiver com 18 anos, deve repetir o citopatológico (CP) aos 21 anos.

- (A) E - E - C - C.
- (B) E - C - C - C.
- (C) C - E - C - C.
- (D) E - C - E - C.

30. Quanto às recomendações para a realização de linfadenectomia pélvica e paraórtica nos casos de carcinoma de endométrio, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Tumores endometrioides, independentemente do estágio, pela sua agressividade.
- II. Tumores com invasão miometrial <50%, grau histológico 1 ou 2, para prescindir da radioterapia.
- III. Para pacientes com tipo histológico seroso, mesmo em estadiamento cirúrgico, estágio 1 (EC1).

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

31. Em relação às mudanças hormonais que ocorrem no climatério, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Há redução da resposta ovariana às gonadotrofinas.
- II. As inibinas têm a função de suprimir as secreções do hormônio foliculo-estimulante (FSH).
- III. A diminuição do número de folículos pré-antrais leva a uma diminuição sutil na concentração de inibina B.
- IV. As inibinas suprimem as secreções hipotalâmicas do FSH.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.

32. Em relação à síndrome de ovários policísticos (SOP), é INCORRETO afirmar que:

- (A) É diagnosticada por hiperandrogenismo (clínico/bioquímico), anovulação crônica e/ou ovários policísticos.
- (B) A maioria das pacientes apresenta sobrepeso.
- (C) Pacientes com SOP apresentam um risco muito aumentado para depressão quando comparadas a pacientes controles.
- (D) O ácido valproico pode ser prescrito nessa condição.

PEDIATRIA

33. Qual das seguintes afirmações sobre a hipertensão arterial pulmonar do recém-nascido (HAPRN) é CORRETA?

- (A) A HAPRN é sempre primária e não pode ser causada por condições secundárias.
- (B) A mortalidade associada à HAPRN em países desenvolvidos pode chegar a 10%.
- (C) A HAPRN só ocorre em recém-nascidos a termo.
- (D) Os recém-nascidos a termo não apresentam risco para HAPRN.

34. Quais fatores de risco são importantes para a avaliação da hiperbilirrubinemia em recém-nascidos?

- (A) Idade gestacional e presença de hipertermia na sala de parto.
- (B) Incompatibilidade sanguínea, perda de peso e dificuldade de aleitamento.
- (C) Nível socioeconômico dos pais.
- (D) Aleitamento materno exclusivo e cor da pele do RN.

35. Durante o ciclo cardíaco, a fase de contração isovolumétrica desempenha um papel crucial na mecânica cardíaca. Em relação a essa fase, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Ocorre logo após o fechamento das válvulas atrioventriculares e antes da abertura das válvulas semilunares, sem alteração no volume ventricular.
- (B) É caracterizada por uma rápida ejeção de sangue para a circulação sistêmica.
- (C) Durante essa fase, os ventrículos estão em relaxamento, e ocorre o enchimento passivo ventricular.
- (D) A contração isovolumétrica ocorre simultaneamente à abertura das válvulas atrioventriculares.

36. O Ministério da Saúde adota as curvas e a classificação do estado nutricional quanto ao IMC sugeridas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim sendo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na faixa etária de 0 a 5 anos, considera-se que a criança tem sobrepeso quando o IMC está entre 2 e 3 escores z.
- (B) Na faixa etária de 0 a 5 anos, considera-se que a criança tem obesidade quando ultrapassa 3 escores z.
- (C) Crianças de 5 a 10 anos com IMC entre 2 e 3 escores z são consideradas como tendo sobrepeso.
- (D) Crianças de 5 a 10 anos com IMC acima de 3 escores z são consideradas como tendo obesidade grave.

37. Qual é a complicação pós-operatória mais comum na correção da hipospádia?

- (A) Curvatura peniana.
- (B) Fístula uretrocutânea.
- (C) Deiscência de sutura.
- (D) Estenose proximal de uretra.

38. Em relação aos eventos adversos relacionados à vacina DTP, relacione as colunas e assinale a sequência correspondente.

- (1) Não contraindica a vacinação.
 - (2) Utilizar a vacina DTPa.
 - (3) Contraindica a vacinação.
- () Reações locais como vermelhidão, calor, edema e endurecimento.
() Episódio hipotônico-hiporresponsivo.
() Crise convulsiva.
() Reação anafilática.

- (A) 1 - 2 - 2 - 3.
- (B) 2 - 3 - 2 - 3.
- (C) 1 - 3 - 1 - 2.
- (D) 2 - 1 - 1 - 2.

39. Entre as seguintes doenças exantemáticas febris, assinale aquela de notificação compulsória.

- (A) Varicela.
- (B) Escarlatina.
- (C) Rubéola.
- (D) Doença de Kawasaki.

40. Em relação aos transtornos psiquiátricos na infância, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O transtorno depressivo maior de início precoce é uma condição frequentemente crônica e recorrente e está associado a prejuízos funcionais significativos.
- (B) Estudos de seguimento de crianças com transtorno disruptivo da desregulação do humor demonstraram que as taxas de conversão de irritabilidade crônica e grave para transtorno bipolar são altas.
- (C) No transtorno bipolar em crianças e adolescentes, os episódios mistos e maníacos são mais comuns do que os depressivos.
- (D) Sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade muitas vezes atrapalham o funcionamento de pacientes com autismo.